

LAZAR

PROYECTO INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE



CIPROFLOXACINA LAZAR
CIPROFLOXACINA 250 mg, 500 mg y 750 mg
Comprimidos recubiertos
Venta bajo receta
Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico, o farmacéutico.

Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlas.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Contenido del prospecto

1. Qué es Ciprofloxacina Lazar y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Ciprofloxacina Lazar
3. Cómo tomar Ciprofloxacina Lazar
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Ciprofloxacina Lazar
6. Contenido del envase e información adicional

1. QUÉ ES CIPROFLOXACINA LAZAR Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Ciprofloxacina Lazar contiene ciprofloxacina, que pertenece al grupo de medicamentos denominados antibióticos. La ciprofloxacina es un antibiótico del tipo de las quinolonas, y actúa eliminando las bacterias que causan infecciones en su organismo.

Ciprofloxacina Lazar se puede utilizar para tratar infecciones por bacterias sensibles en:

- los senos paranasales (sinusitis)
- los pulmones.
- el tracto urinario, incluyendo los riñones o la vejiga.
- la próstata.
- región intrabdominal
- la piel y bajo la piel, incluidos los músculos y huesos.

Dr. LAZAR Y Cía. S. A.
Química e Industrial



DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

IF-2020-00628742-APN-DGA#ANMAT

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR CIPROFLOXACINA LAZAR

No tome Ciprofloxacina Lazar si:

- Es alérgico a ciprofloxacina, a otros antibióticos del tipo de las quinolonas como moxifloxacina, levofloxacina u ofloxacina, o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Padece o ha padecido epilepsia.
- Ha sufrido alguna vez problemas en los tendones, como tendinitis, que estuvieran relacionados con el tratamiento con antibióticos del tipo de las quinolonas.
- Es un niño o adolescente en periodo de crecimiento.
- Está embarazada, pudiera quedar embarazada o cree que podría estar embarazada.
- Está en periodo de lactancia.

No tome este medicamento si le afecta cualquiera de los casos arriba descritos. En caso de duda, consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar Ciprofloxacina Lazar.

Advertencias y precauciones

- **Utilice antibióticos solamente con la prescripción de un médico.**
- **No se automedique ni ofrezca antibióticos a otras personas.**
- **Cumpla el tratamiento según lo indicado, respetando la dosis, horarios de la toma y tiempo de tratamiento.**
- **No prolongue ni interrumpa el tratamiento salvo que se lo indique el profesional.**
- **No utilice antibióticos que le hayan sobrado o que le hayan sobrado a otros.**
- **Lávese frecuentemente las manos con agua y con jabón.**
- **Mantenga su calendario de vacunación al día.**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Ciprofloxacina Lazar si:

- Tiene 60 años de edad o más.
- Está usando corticoides, a veces llamados esteroides (ver sección "Toma de Ciprofloxacina Lazar con otros medicamentos").
- Ha recibido un trasplante.
- Ha tenido alguna vez un ataque epiléptico (convulsiones).
- Ha sufrido daño cerebral debido a un accidente cerebrovascular u otra lesión cerebral.
- Tiene problemas de riñones.
- Tiene lo que se conoce como "deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa", ya que puede ser propenso a tener problemas graves en la sangre cuando esté tomando este medicamento.
- Ha tenido alguna vez problemas de salud mental.
- Alguna vez ha tenido problemas de corazón: se debe tener precaución cuando esté utilizando este tipo de medicamento, si ha nacido con, o tiene antecedentes familiares de

Dr. LAZAR Y Cía. S. A.
Química e Industrial


DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

IF-2020-00628742-APN-DGA#ANMAT

prolongación del intervalo QT (detectado en un electrocardiograma –ECG–), tiene desequilibrio en los niveles de sales en sangre (especialmente un bajo nivel de potasio o magnesio en sangre), tiene un ritmo cardíaco lento (denominado “bradicardia”), tiene un corazón débil (insuficiencia cardíaca), tiene antecedentes de ataque al corazón (infarto de miocardio), si es una mujer o una persona de edad avanzada o está tomando otros medicamentos que puedan producir cambios anormales en el ECG (ver sección “Toma de Ciprofloxacina Lazar con otros medicamentos”).

- Es diabético.
- Alguna vez ha tenido problemas de hígado.
- Padece miastenia gravis.
- Si le han diagnosticado agrandamiento o “abultamiento” de un vaso sanguíneo grande (aneurisma aórtico) o aneurisma periférico de vasos grandes.
- Si ha experimentado un episodio previo de disección aórtica (un desgarro en la pared de la aorta).
- Si tiene antecedentes familiares de aneurisma aórtico o disección aórtica u otros factores de riesgo o condiciones predisponentes (por ejemplo, trastornos del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, o el síndrome vascular de Ehlers-Danlos, o trastornos vasculares como la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes, la enfermedad de Behcet, presión arterial alta, o aterosclerosis conocida).
- No debe tomar medicamentos antibióticos que contengan quinolonas, incluyendo [Ciprofloxacina Lazar®], si ha experimentado alguna reacción adversa grave en el pasado al tomar una quinolona. En esta situación, debe informar a su médico tan pronto como sea posible.

Informe a su médico o farmacéutico antes de tomar Ciprofloxacina Lazar, si no está seguro de que alguno de los casos arriba descritos es aplicable a usted.

Si siente un dolor fuerte y repentino en el abdomen, el tórax o la espalda, acuda inmediatamente a un servicio de urgencias.


Toma de Ciprofloxacina Lazar con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. Esto es porque la ciprofloxacina puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos. Además, algunos medicamentos pueden afectar al funcionamiento de la ciprofloxacina.

En particular, informe a su médico si está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos, ya que aumenta la posibilidad de sufrir efectos adversos al tomarlos junto con ciprofloxacina:

- Corticosteroides, a veces llamados esteroides: usados para la inflamación. Puede tener más probabilidades de sufrir inflamación y/o rotura de sus tendones.

Dr. LAZAR Y Cía. S. A.
Química e Industrial


DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

IF-2020-00628742-APN-DGA#ANMAT

- Warfarina: usada para hacer la sangre más líquida. Puede tener mayor probabilidad de sufrir una hemorragia. Su médico puede necesitar análisis de sangre periódicos para comprobar si su sangre coagula correctamente.
- Teofilina: usada para problemas respiratorios. Tiene mayor probabilidad de sufrir un ataque epiléptico (convulsiones) si la toma con ciprofloxacina.
- Antiinflamatorios no esteroideos (AINES): usados para el dolor y la inflamación como la aspirina, ibuprofeno, ketoprofeno. Tiene mayor probabilidad de sufrir un ataque epiléptico (convulsiones) al tomarlos con ciprofloxacina.
- Ciclosporina: usada después de los trasplantes de órganos. Puede tener mayor probabilidad de sufrir los efectos adversos de la ciclosporina.
- Medicamentos de acción conocida sobre los latidos de su corazón. Esto incluye medicamentos usados para el ritmo anormal del corazón (antiarrítmicos como quinidina, disopiramida, sotalol, y amiodarona), para la depresión (antidepresivos tricíclicos como amitriptilina e imipramina), para trastornos psiquiátricos (antipsicóticos), y para infecciones bacterianas (antibióticos "macrólidos" como eritromicina, azitromicina y claritromicina).

Informe a su médico si alguno de los casos anteriores le aplica a usted.

Test de tuberculosis

Este medicamento puede causar un resultado de "falso negativo" en algunos tests de laboratorio que buscan la bacteria que causa la tuberculosis.

Embarazo y lactancia

No tome este medicamento si:

- está embarazada, pudiera quedarse embarazada o cree que podría estar embarazada.
- está en periodo de lactancia o tiene previsto estarlo.

Conducción y uso de máquinas

Pueden aparecer algunos efectos adversos tales como mareos, somnolencia, alteración del equilibrio (vértigo) o alteraciones visuales. Algunos de estos efectos adversos pueden afectar a su capacidad para concentrarse o disminuir su velocidad de reacción. Si esto ocurre, no conduzca ni realice cualquier trabajo que requiera un nivel elevado de atención.

3. CÓMO TOMAR CIPROFLOXACINA LAZAR

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Trague los comprimidos enteros con un poco de agua. Los comprimidos se pueden tomar durante o entre las comidas, dos veces al día.

No tome Ciprofloxacina Lazar al mismo tiempo que los siguientes medicamentos, ya que pueden afectar la absorción de Ciprofloxacina Lazar: comprimidos de hierro (para la anemia),

Dr. LAZAR Y Cía. S. A.
Química e Industrial


DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

IF-2020-00628742-APN-DGA#ANMAT

suplementos de zinc, antiácidos que contengan aluminio o magnesio (para la acidez o ardor de estómago), o sucralfato (para las úlceras de estómago).

Adultos y pacientes de edad avanzada: Su médico decidirá qué cantidad de ciprofloxacina debe tomar. La dosis dependerá del tipo de infección que tenga y de dónde está localizada la infección en su cuerpo. La duración del tratamiento dependerá de la gravedad de su infección. Si cree que el efecto del medicamento es demasiado débil o fuerte, no cambie la dosis usted mismo, pregunte a su médico.

Infección en los senos paranasales

- un comprimido de Ciprofloxacina Lazar 500 a 750 mg vía oral cada 12 hs,

Infección en los pulmones,

- un comprimido de Ciprofloxacina Lazar 500 a 750 mg vía oral cada 12 hs,

Infección en el tracto urinario, incluyendo riñones o vejiga

- un comprimido de Ciprofloxacina Lazar 250 a 500 mg vía oral cada 12 hs

Infección en la próstata

- un comprimido de Ciprofloxacina Lazar 500 a 750 mg vía oral cada 12 hs,.

Infecciones intrabdominales

- un comprimido de Ciprofloxacina Lazar 500 a 750 mg vía oral cada 12 hs,

Infección en la piel y debajo de la piel incluidos los músculos y los huesos

- un comprimido de Ciprofloxacina Lazar 500 a 750 mg vía oral cada 12 hs,

Adultos y pacientes de edad avanzada con problemas de riñones

Su médico posiblemente le administrará una dosis más baja.

Uso en niños y adolescentes

Este medicamento no se debe administrarse a niños ni adolescentes.


Proteja su piel de la luz solar

No exponga su piel directamente al sol (aun estando nublado) mientras esté tomando este medicamento y durante dos días después de dejar de tomarlo, ya que su piel se hará mucho más sensible al sol y puede quemarse.

Si olvidó tomar Ciprofloxacina Lazar

Si olvidó tomar una dosis, tómela enseguida, a no ser que sea casi la hora de su siguiente dosis. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Dr. LAZAR Y Cía. S. A.
Química e Industrial


DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

IF-2020-00628742-APN-DGA#ANMAT

Si interrumpe el tratamiento con Ciprofloxacina Lazar

No interrumpa su tratamiento con ciprofloxacina aunque se sienta mejor. Es importante que termine el tratamiento que su médico le ha prescrito. Si deja de tomar los comprimidos demasiado pronto, la infección puede reaparecer, su estado puede empeorar o la bacteria se puede hacer resistente al medicamento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Normalmente son efectos de leves a moderados y suelen desaparecer en poco tiempo.

Casos muy raros de reacciones adversas serias de larga duración (hasta meses o años) o permanentes, como inflamaciones de los tendones, ruptura de tendones, dolor en las articulaciones, dolor en las extremidades, dificultad para caminar, hormigueo, cosquilleo, ardor, entumecimiento o dolor (neuropatía), depresión, fatiga, trastornos del sueño, deterioro de la memoria, así como el deterioro de la audición, la visión y el gusto y el olfato han sido asociadas con la administración de antibióticos que contienen quinolonas, independientemente de los factores de riesgo preexistentes.

El dolor y la hinchazón en las articulaciones y la inflamación o ruptura de los tendones pueden ocurrir raramente. Su riesgo aumenta si es una persona mayor de 60 años, ha recibido un trasplante de órgano, tiene problemas de riñón o si está siendo tratado con corticosteroides. La inflamación y la ruptura de los tendones pueden ocurrir dentro de las primeras 48 horas de tratamiento e incluso hasta varios meses después de interrumpir la terapia con Ciprofloxacina Lazar®. Al primer signo de dolor o inflamación de un tendón (por ejemplo, en su tobillo, muñeca, codo, hombro o rodilla), deje de tomar Ciprofloxacina Lazar® y comuníquese con su médico.

Rara vez puede experimentar síntomas de daño a los nervios (neuropatía) como dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento y/o debilidad, especialmente en los pies y las piernas o las manos y los brazos. Si esto sucede, deje de tomar Ciprofloxacina Lazar® e informe a su médico inmediatamente. Los antibióticos que contienen quinolonas, incluyendo Ciprofloxacina Lazar®, han sido asociados con efectos secundarios muy raros pero graves, algunos de ellos de larga duración (continuando meses o años), incapacitantes o potencialmente irreversibles. Esto incluye el tendón, dolor en los músculos y articulaciones de las extremidades superiores e inferiores, dificultad para caminar, hormigueo, cosquilleo, entumecimiento o ardor (parestesia), trastornos sensoriales que incluyen deterioro de la visión, gusto y olfato y audición, depresión, deterioro de la memoria, fatiga severa y trastornos severos del sueño. Si experimenta alguno

Dr. LAZAR Y Cía. S. A.
Química e Industrial



DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

IF-2020-00628742-APN-DGA#ANMAT

de estos efectos secundarios después de tomar Ciprofloxacina Lazar®, comuníquese con su médico inmediatamente antes de continuar el tratamiento.

Efectos adversos:

Comunes:

Puede afectar a 1 en 10 personas

- Náuseas, diarrea

Poco comunes:

Puede afectar a 1 en 100 personas

- Infecciones por hongos
- Aumento de cantidad de eosinófilos, un tipo de glóbulos blancos de la sangre
- Disminución del apetito
- Hiperactividad o agitación
- Dolor de cabeza, mareo, problemas de sueño, alteraciones del gusto.
- Vómitos, dolor abdominal, problemas digestivos como molestias estomacales (indigestión/ acidez) flatulencia
- Alteración de algunos análisis de laboratorio (transaminasas y/o bilirrubina)
- Erupción, picazón, o urticaria
- Dolor de articulaciones en los adultos
- Mal funcionamiento de los riñones
- Dolor de los músculos y los huesos, sensación de malestar (astenia) o fiebre
- Aumento de la fosfatasa alcalina en sangre

Raro:

Puede afectar a 1 en 1000 personas

- Inflamación de los intestinos (colitis) debido al uso del antibiótico (puede ser fatal en casos muy raros)
- Cambios en el recuento sanguíneo (leucopenia, leucocitosis, neutropenia, anemia), aumento o disminución de las células de la coagulación de la sangre (trombocitos)
- Reacción alérgica, hinchazón (edema) o hinchazón rápida de la piel y las membranas mucosas (angioedema)
- Aumento del azúcar en sangre (hiperglucemia)
- Disminución del azúcar en sangre (hipoglucemia)
- Confusión, desorientación, reacciones de ansiedad, sueños extraños, depresión (potencialmente puede conducir a pensamientos suicidas, intención de suicidio o suicidio) o alucinaciones
- Pinchazos, estimulación inusual de la sensibilidad de los sentidos, disminución de la sensibilidad de la piel, temblores, convulsiones o mareos
- Problemas de la visión, incluyendo visión doble
- Tinnitus (zumbido en los oídos), pérdida de la audición, daño de la audición
- Latidos acelerados del corazón (taquicardia)
- Dilatación de los vasos sanguíneos (vasodilatación), presión baja o debilidad
- Falta de aire, incluyendo los síntomas asmáticos

Dr. LAZAR Y Cía. S. A.
Química e Industrial



DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

IF-2020-00628742-APN-DGA#ANMAT

- Desórdenes hepáticos, ictericia (piel amarilla), ictericia colestática o hepatitis
- Sensibilidad a la luz
- Dolor muscular, inflamación de las articulaciones, aumento del tono muscular o calambres
- Fallo renal, presencia de sangre o cristales en la orina, inflamación del tracto urinario
- Retención de líquido o excesiva transpiración
- Aumento de los niveles de la enzima amilasa

Muy raros:

Puede afectar a 1 en 10000 personas

- Reducción del recuento de los glóbulos rojos de la sangre (anemia hemolítica), disminución peligrosa de los glóbulos blancos sanguíneos (agranulocitosis); disminución del número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas (pancitopenia), que puede ser fatal, depresión de la médula ósea, lo cual puede ser también fatal
- Reacciones alérgicas severas (reacción anafiláctica o shock anafiláctico, que puede ser fatal, enfermedad del suero)
- Disturbios mentales (reacciones psicóticas que potencialmente pueden conducir a pensamientos de suicidio, ataque suicida o suicidio)
- Migrañas (dolor de cabeza muy intenso), disturbios en la coordinación, inestabilidad para caminar (disturbios en el andar), desórdenes del sentido del olfato (desórdenes del olfato), presión cerebral (presión intracraneal y pseudotumor cerebral)
- Distorsiones de los colores visuales
- Inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos (vasculitis)
- Pancreatitis
- Muerte de las células del hígado (necrosis hepática) muy raramente conduce a la amenaza de la vida por fallo hepático
- Pequeña hemorragia puntual debajo de la piel (petequia), varias erupciones de la piel o rash (por ej. Síndrome de Stevens Johnson, potencialmente fatal, o necrosis epidérmica tóxica)
- Debilidad muscular, inflamación de tendones, ruptura de tendones, especialmente el tendón de Aquiles, desmejoramiento de los síntomas de miastenia gravis


No conocido:

No se tiene datos de la frecuencia

- Problemas asociados con el sistema nervioso como dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento y/o debilidad en las extremidades (neuropatía periférica y polineuropatía)
- Ritmo cardíaco acelerado y anormal, ritmo cardíaco irregular con amenaza de vida, alteración del ritmo cardíaco (llamado prolongación del intervalo QT, se puede observar en el electrocardiograma)
- Erupción pustulosa
- Alteraciones de la coagulación de la sangre en pacientes tratados con anticoagulantes antagonistas de la Vitamina K

Si observa efectos adversos no mencionados en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Dr. LAZAR Y Cía. S. A.
Química e Industrial


DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

IF-2020-00628742-APN-DGA#ANMAT

5. CONSERVACIÓN DE CIPROFLOXACINA LAZAR

Es preferible conservar Ciprofloxacina Lazar en su envase original, en un lugar seco.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase y el blíster. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONTENIDO DEL ENVASE

Sobredosificación:

Si accidentalmente toma más comprimidos de los que debe, informe a su médico o consiga inmediatamente ayuda médica. Lleve el medicamento para que el médico sepa lo que ha tomado.

Los efectos que pueden aparecer son: ataques epilépticos (convulsiones), confusión, mareos, disminución de la conciencia, temblores, trastornos del corazón que pueden ocasionar latidos irregulares del corazón así como malestar (náuseas) o ardor de estómago.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse a los Centros de Toxicología:

Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001

Hospital de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650

Hospital Posadas: (011) 4658-7777 4654-6648

Fórmula:

Cada comprimido recubierto de 250 mg contiene:

Ciprofloxacina (como clorhidrato, monohidrato).....	250,00 mg
Povidona K30	1,92 mg
Almidón pregelatinizado	70,39 mg
Almidón glicolato de sodio	15,38 mg
Dióxido de silicio coloidal	1,92 mg
Estearato de magnesio	3,85 mg
Sacarina sódica.....	0,28 mg
Carbowax 6000.....	0,31 mg
Propilenglicol	6,92 mg
Laca azul brillante.....	0,01 mg
HPMC LAY AQ H05001P4.....	10,77 mg

Cada comprimido recubierto de 500 mg contiene:

Ciprofloxacina (como clorhidrato, monohidrato)	500,00 mg
Povidona K30	3,85 mg
Almidón pregelatinizado	140,77 mg
Almidón glicolato de sodio	30,77 mg
Dióxido de silicio coloidal	3,85 mg
Estearato de magnesio	7,69 mg

Dr. LAZAR Y Cía. S. A.
Química e Industrial



DANIELA A. CASAS
FARMACEUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

IF-2020-00628742-APN-DGA#ANMAT

LAZAR



HPMC Lay AQ H05001P4.....	28,00 mg
Laca azul brillante	32,40 µg
Sacarina sódica	0,72 mg
Propilenglicol	1,80 mg
Carbowax 4000	0,80 mg

Cada comprimido recubierto de 750 mg contiene:

Ciprofloxacina (como clorhidrato, monohidrato).....	750,00 mg
Povidona K30	5,77 mg
Almidón pregelatinizado	211,15 mg
Almidón glicolato de sodio	46,15 mg
Dióxido de silicio coloidal	5,77 mg
Estearato de magnesio	11,54 mg
Sacarina sódica.....	1,08 mg
Carbowax 6000.....	1,20 mg
Propilenglicol	2,70 mg
Laca azul brillante.....	0,01 mg
HPMC LAY AQ H05001P4.....	42,00 mg

Cada frasco ampolla contiene:

Ciprofloxacina (como lactato).....	200,00 mg
Cloruro de sodio	850,00 mg
Acido láctico c.s.p.	pH= 4,1-4,3
Agua destilada apiretógena c.s.p.	100,00 ml

Presentaciones:

- Ciprofloxacina Lazar®* 250 mg
- Envases conteniendo 10 comprimidos recubiertos.
- Ciprofloxacina Lazar®* 500 mg
- Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos recubiertos.
- Ciprofloxacina Lazar®* 750 mg
- Envases conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

"Ante cualquier inconveniente con el medicamento el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 39.516

Dr. LAZAR Y Cía. S. A.
Química e Industrial


DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

IF-2020-00628742-APN-DGA#ANMAT

LAZAR

Dr. Lazar & Cía S.A.Q. e I.
Av. Velez Sársfield 5855 B1605 EPI Munro
Directora Técnica: Daniela A. Casas, Farmacéutica y Bioquímica.



Fecha última revisión del prospecto:

Dr. LAZAR Y Cía. S. A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

IF-2020-00628742-APN-DGA#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-97705311 INF PAC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.