

DELORAT® B

DES LoratADINA - BETAMETASONA

Comprimidos recubiertos
Jarabe
Venta bajo receta
Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Delorat® B?

Cada comprimido recubierto contiene:

Desloratadina: 5,00 mg; Betametasona: 0,60 mg; Celulosa microcristalina PH 101: 88,40 mg; Almidón glicolato de sodio: 3,00 mg; Talco: 2,00 mg; Estearato de magnesio: 1,00 mg; Hidroxipropilmetilcelulosa 2910: 1,80 mg; Dióxido de titanio: 0,96 mg; Polietilenglicol 400: 0,24 mg; Óxido de hierro rojo: 0,03 mg.

Cada ml de jarabe contiene:

Desloratadina: 1,00 mg; Betametasona: 0,05 mg; Ácido cítrico anhidro: 0,50 mg; Citrato de sodio dihidrato: 1,30 mg; Benzoato de sodio: 1,00 mg; EDTA disódico: 0,30 mg; Propilenglicol: 100,00 mg; Esencia de banana: 0,80 mg; Azúcar: 490,00 mg; Sorbitol 70%: 150,00 mg; Agua purificada c.s.p.: 1,00 ml.

La Desloratadina es una sustancia conocida como antihistamínico, mientras que la Betametasona es un corticoide.

Acción Terapéutica:

Este medicamento es un antialérgico y antiinflamatorio

¿Para qué se usa Delorat® B?

Está indicado en los estados alérgicos severos que requieran el tratamiento con una asociación de un antihistamínico y un corticoide sistémico.

¿Qué personas no pueden recibir Delorat® B?

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico a algunos de los ingredientes del medicamento, o si padece ciertas enfermedades como: Infecciones micóticas sistémicas o tuberculosis activa.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Informe a su médico si está por iniciar o está bajo un proceso de inmunización (plan de vacunación) mientras esté tomando la medicación; así como si padece algunos de los siguientes trastornos: colitis ulcerosa inespecífica, diverticulitis, gastritis, insuficiencia renal, hipertensión arterial, osteoporosis, diabetes y miastenia gravis.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el

medicamento. Con el uso de desloratadina se informaron más frecuentemente fatiga, sequedad de boca y dolor de cabeza. Las reacciones adversas a la betametasona son similares a las comunicadas con otros corticoides y se relacionan con la posología y la duración del tratamiento. Ante cualquier duda o aparición de algún síntoma durante el tratamiento, consulte con su médico.

¿Cómo se usa Delorat® B?

Siga exactamente las instrucciones de administración de **Delorat® B** indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. Pida a su médico que le aclare cualquier cuestión que no entienda contenida en el prospecto que acompaña al medicamento. Adultos y niños de 12 años o mayores: 5 ml por día o un comprimido/día.

Niños de 6 a 11 años: 2,5 ml por día.


Niños de 2 a 5 años: 1,25 ml por día.

La dosis puede ser modificada por el médico de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Si olvidó tomar su dosis a su hora, tómela lo antes posible, y después continúe con el esquema de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

No se auto-medique con **Delorat® B**. Es importante que usted no ingiera mayor cantidad de **Delorat® B** que lo indicado por su médico. No se espera que una sobredosis accidental cause problemas graves. No obstante, si toma más **Delorat® B** del que le han dicho, póngase en contacto con su médico.

Modo de utilización de jeringa dosificadora

1. Retire la tapa y coloque el inserto adjunto a la jeringa dosificadora en boca del frasco (ver figura 1)
2. Inserte el pico de la jeringa en el orificio del inserto dosificador (Ver figura 2)
3. Invierta el frasco y tire el émbolo de la jeringa hacia atrás, para extraer la cantidad de jarabe indicada por su médico, adminístresela directamente al niño en la boca (Vr figura 3 y 4)
4. Luego de usar la jeringa dosificadora, lave con abundante agua, seque y guarde en el estuche para la próxima utilización.
5. Tape el frasco conservando el inserto dosificador en la boca del mismo, conserve el jarabe en su envase original.



¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650
Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900
www.lazar.com.ar
ANMAT Responde
0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Presentaciones:

Envases conteniendo 10 comprimidos recubiertos.
Envases conteniendo un frasco con 60 ml de jarabe.

Conservación:

Conservar en lugar seco, a menos de 30°C.
No utilizar luego de la fecha de vencimiento.

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:
<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>
o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas."

Especialidad Medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 57.322



Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de revisión de información para
el paciente: 11/12/2013

36647/2
P318