

PROYECTO DE INFORMACION PARA EL PACIENTE

TAMSULOSINA LAZAR
TAMSULOSINA CLORHIDRATO
Cápsulas de liberación controlada
Industria Argentina
Venta bajo receta

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Tamsulosina Lazar®?

Tamsulosina Lazar® contiene Tamsulosina clorhidrato 0,4 mg. Excipientes c.s.

Acción Terapéutica:

Este medicamento relaja las fibras musculares involuntarias de la próstata y tracto urinario, facilitando el paso de orina y la micción. Además, disminuye la sensación de urgencia miccional.

¿Para qué se usa Tamsulosina Lazar®?

Tamsulosina Lazar® está indicado en varones para aliviar los síntomas urinarios causados por el agrandamiento de la próstata (hiperplasia benigna de próstata). Estos síntomas pueden incluir dificultad en la micción (chorro débil), goteo, urgencia y necesidad de orinar frecuentemente tanto por la noche como durante el día.

¿Qué personas no pueden recibir Tamsulosina Lazar®?

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico a algunos de los ingredientes del medicamento. Además si:

- Tiene antecedentes de sufrir descenso de la presión arterial al ponerse de pie, que le causa mareos o desmayos.
- Padece problemas graves de hígado.

Niños: no administre este medicamento a niños ni adolescentes menores de 18 años porque no tiene ninguna aplicación en esta población.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Si Ud. está tomando algún otro medicamento consulte a su médico antes de tomar Tamsulosina Lazar.

Tenga especial cuidado con Tamsulosina Lazar® si:

- Padece mareos o desmayos, especialmente al incorporarse bruscamente o ponerse de pie. Tamsulosina Lazar® puede precipitar o agravar estos síntomas. Debe acostarse o sentarse hasta que los síntomas hayan desaparecido.
- Padece problemas graves de riñón, consulte a su médico.

- Va a someterse a una operación quirúrgica ocular debido a una opacidad del cristalino (cataratas). Es importante que informe a su oculista si está tomando o ha tomado anteriormente tamsulosina.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento.

Los efectos secundarios más frecuentes con Tamsulosina Lazar® son mareos, visión borrosa, somnolencia y síncope. No hay evidencia de que tamsulosina afecte a la capacidad para conducir y para utilizar máquinas; sin embargo tenga cuidado si comienza a tener mareos. Ante cualquier duda o aparición de algún síntoma durante el tratamiento, consulte con su médico.

¿Cómo se usa Tamsulosina Lazar®?

Siga exactamente las instrucciones de administración de Tamsulosina Lazar® indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. Pida a su médico que le aclare cualquier cuestión que no entienda contenida en el prospecto que acompaña al medicamento.

La dosis normal es de una cápsula al día. Puede tomar tamsulosina con o sin comida, preferiblemente a la misma hora cada día.

El comprimido debe tragarse entero. Es importante que no rompa ni mastique la cápsula ya que esto afectará el buen funcionamiento de la tamsulosina.

Si ha olvidado tomar Tamsulosina Lazar® como se le ha recomendado, puede tomar su dosis más tarde en el mismo día. En caso de que haya omitido la dosis de un día, tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome dosis doble para compensar la dosis olvidada.

No se auto-medique con Tamsulosina Lazar®. Es importante que usted no tome mayor cantidad de Tamsulosina Lazar® que lo indicado por su médico. Dosis mayores o más frecuentes no necesariamente aceleran ni dan mejores resultados.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Si toma más tamsulosina de la que debe, su presión arterial puede disminuir de repente. Puede sufrir mareos, debilidad, vómitos, diarrea y desmayos. Recuéstese para minimizar los efectos de la presión arterial baja y consulte a su médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o concurra al hospital más cercano o comuníquese con los siguientes centros de toxicología:

Hospital de Pediatría "Ricardo Gutiérrez : (011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas : (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650

Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar

011-5550-2900



www.lazar.com.ar

ANMAT Responde

0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservación:

Mantener lejos del calor y la luz solar directa, a una temperatura ambiente entre 15 y 30 °C, en lugar seco.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°

Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q e I.

Av. Vélez Sarsfield 5853/5855

B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires

Directora Técnica: Daniela A. Casas, Farm. y Bioq.

Elaborado en Vicrofer S.R.L. - Santa Rosa 3676 (1644) Victoria - Pcia. de Buenos Aires.

Última revisión: .../.../...