

FLEBOSMINA®
HIDROSMINA
Gel
Industria Argentina
Venta bajo receta

Fórmula:

Cada 100 g de gel contiene:
Hidrosmína 2,000 g
Carbomero 0,750 g
Trietanolamina 0,900 g
Metilparabeno 0,100 g
Propilparabeno 0,050 g
Agua purificada c.s.p. ... 100,000 g

Acción Terapéutica:

Venotónico. Antivaricoso.

Acción farmacológica:

La hidrosmína es un flavonoide obtenido sintéticamente. Su estructura química está relacionada a la diosmína, pero a diferencia de ésta posee una elevada hidrosolubilidad. Las características farmacológicas básicas de la hidrosmína consisten en reducir el incremento en la permeabilidad vascular provocada por la histamina y la bradiquinina, asimismo reduce la fragilidad capilar aumentada, siendo su potencia de 2 a 3 veces mayor que la diosmína y la hidroxietilrutina respectivamente. En animales con resistencia capilar disminuida la hidrosmína la normaliza con una potencia mayor a la diosmína y rutina. La hidrosmína incrementa el tono venoso con una potencia 10 veces mayor que la hidroxietilrutina y en concentraciones plasmáticas de 10 a 30 (mcg/ml) produce una mejoría evidente sobre la deformación eritrocitaria, acción ésta que no se observa con la diosmína, permitiendo un efecto beneficioso sobre las propiedades reológicas de la sangre, particularmente en pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Sobre el sistema linfático tiene un efecto linfotrope, reduciendo los síntomas cardinales de la insuficiencia venolinfática.

La hidrosmína resultó superior al placebo en el tratamiento de acúfenos y trastornos auditivos en pacientes con insuficiencia vertebral.

Indicaciones:

Tratamiento tópico de las manifestaciones de la insuficiencia venosa. Síndrome varicoso.

Posología:

Extiéndase sobre la zona afectada una delgada capa del gel, 3 veces por día mediante suave fricción. Luego de la misma, proceder al lavado de manos. Evitar el contacto con la boca y ojos.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al principio activo o a algunos de los componentes del producto.

Reacciones Adversas:

No se han descrito. No se han realizado estudios de interacciones con medicamentos o alimentos.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Niños R. Gutiérrez
(011) 4962-6666/2247
Hospital Posadas
(011) 4658-7777 4654-6648

Presentaciones:

Envases conteniendo 40 g de gel.

Conservación:

Conservar a temperatura inferior a los 25°C y evitar de mantener a temperaturas superiores.

**MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 54.525.

Dr. LAZAR y Cia. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro,
Poia, de Buenos Aires
Directora Técnica:
Daniela A. Casas,
Farm. y Bioq.



LAZAR

Fecha de aprobación del prospecto: 15/5/2008

36782/3
P135