



FLOGOL[®] ETOFENAMATO 5%

Gel
Vía de administración: Tópica
Venta Libre
Industria Argentina

1. ¿Qué contiene FLOGOL?

Cada 100 gramos de gel contienen:
Etofenamato 5 gramos, Excipientes: Agua destilada; Propilenglicol; Polietilenglicol 400; Trietanolamina; Metilparabeno; Esencia de romero; Isopropanol.

2. Acción terapéutica

FLOGOL es un medicamento antiinflamatorio con propiedades calmantes del dolor.

3. ¿Para qué se usa FLOGOL?

FLOGOL está indicado en adultos y adolescentes (mayores de 12 años) para el alivio local del dolor y de la inflamación leves y ocasionales producidos por: pequeñas contusiones, golpes, distensiones, torticolis u otras contracturas, lumbalgias y esguinces leves producidos como consecuencia de una torcedura.

4. ¿Qué personas no pueden usar FLOGOL?

No use FLOGOL
Si es alérgico al etofenamato o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
Si la zona donde se debe aplicar el gel está irritada, con heridas o presenta alguna enfermedad de la piel.
En mucosas ni ojos.
Si ha sufrido alguna reacción alérgica provocada por ácido acetilsalicílico u otro antiinflamatorio.

5. ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Advertencias y precauciones
Utilícelo solo sobre piel intacta, no sobre heridas abiertas, mucosas o piel irritada.
Evite el contacto con los ojos, en caso de producirse lavar abundantemente con agua.
No utilice FLOGOL en áreas extensas ni de forma prolongada. Puede provocar irritación y sequedad en la piel.
No utilice vendajes oclusivos.
Evite aplicarlo en la misma zona que otras preparaciones tópicas.
No exponga la zona tratada al sol para reducir el riesgo de aparición de reacción alérgica por fotosensibilidad.
Tenga especial cuidado si sufre: úlcera gastroduodenal, colitis ulcerosa, alteraciones de la coagulación, tensión arterial elevada, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o insuficiencia hepática.
Si los síntomas persisten más de 7 días o se produce irritación o empeoramiento, deberá consultar con su

médico.

Uso de FLOGOL con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, especialmente si se trata de otros analgésicos, incluso los adquiridos sin receta médica.
Evite aplicar FLOGOL en la misma zona que otras preparaciones tópicas.
No se recomienda el uso simultáneo con medicamentos tópicos antiinfecciosos.

Niños y adolescentes

No utilizar en menores de 12 años.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, o cree que podría estar embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
FLOGOL no debe utilizarse durante el embarazo excepto si es claramente necesario.

Durante el periodo de lactancia, este medicamento sólo debe aplicarse en áreas pequeñas y durante un corto periodo de tiempo.

Conducción y uso de máquinas

La influencia de FLOGOL sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula.

6. ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Al igual que todos los medicamentos, FLOGOL puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Entre dichos efectos adversos se incluyen en orden de mayor a menor frecuencia:
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: enrojecimiento de la piel; reacciones alérgicas de la piel (picaón, erupciones, enrojecimiento, hinchazón o ampollas) que generalmente desaparecen rápidamente con la interrupción del tratamiento; reacciones alérgicas en la piel por exposición al sol.

7. ¿Cómo se usa FLOGOL?

La dosis recomendada es:
Adultos y adolescentes (mayores de 12 años): Aplicar 3 ó 4 veces al día una ligera capa de gel sobre la zona afectada y friccionar ligeramente para que se absorba.
Lavar las manos después de cada aplicación.
En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Uso en niños y adolescentes

No administrar en niños menores de 12 años dada la ausencia de datos sobre seguridad y eficacia en esta población.

Si usa más FLOGOL del que debe

Debido a su uso cutáneo, no es probable que se

produzca intoxicación. No obstante, si usted ha utilizado este medicamento más de lo que debe, o en caso de ingestión accidental; puede presentarse irritación en la piel, dolor de cabeza, mareo o dolor abdominal. Eliminar el medicamento lavando toda la superficie afectada con abundante agua.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTION ACCIDENTAL CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández:
(011) 4808-2655 / 4801-7767
Optativamente otros centros de intoxicaciones.

Si olvidó usar FLOGOL

No use una dosis doble para compensar la aplicación olvidada.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a ANMAT. Responde: 0800 333 1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Conservación de FLOGOL
Conservar a una temperatura entre 15°C y 30°C.

Presentaciones
Envases conteniendo 30 y 100 g.

Especialidad medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud. Certificado N° 36.741

Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

LAZAR

Fecha de última revisión del prospecto: 08/2025

36777/1
P707