



INFORMACION PARA EL PACIENTE

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Qué contiene IBUMULTIN®?

Cada comprimido de 400 mg contiene:

Ibuprofeno: 400,000 mg. Excipientes: Almidón pregelatinizado; Celulosa microcristalina; Laurilsulfato de sodio; Almidón de maíz; Dióxido de silicio coloidal; Povidona (K-90); Ácido esteárico; Croscarmelosa sódica; Talco.

Acción Terapéutica:

Analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Calma el dolor, alivia la inflamación, baja la fiebre.

¿Para qué se usa IBUMULTIN®?

IBUMULTIN® alivia los dolores de origen inflamatorio y no inflamatorio como, por ejemplo: dolor de espalda, dolores musculares, dolores menstruales, dolor de cabeza, dolores de dientes, dolor de garganta. En cuadros febriles, **IBUMULTIN®** baja la fiebre.

¿Qué personas no pueden recibir IBUMULTIN®?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a algunos de los componentes del medicamento, ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios, o si padece ciertas enfermedades como enfermedades del hígado, corazón y riñón. Menores de 15 años.

Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Advertencias y precauciones

Hable con su médico o farmacéutico si:

Usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo "Infecciones")

Infecciones:

Ibumultin puede esconder los signos de infecciones como la fiebre

y el dolor. Por lo tanto es posible que Ibumultin pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

Si usted padece alguna enfermedad del corazón o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol o triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, si usted es mayor de 65 años, si padece asma, alergias, problemas de estómago (ardor de estómago): Consulte a su médico.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Al igual que todos los medicamentos este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos de los medicamentos como ibuprofeno son más comunes en personas mayores de 65 años.

La incidencia de efectos adversos es menor en tratamientos cortos y si la dosis diaria está por debajo de la dosis máxima recomendada.

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas en la sangre), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

¿Cómo se usa IBUMULTIN®?

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene una infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

Tomar un comprimido cada 6 a 8 horas mientras los síntomas persistan. La dosis diaria no debe superar los 1200 mg/día (3 comprimidos de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas. Deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días por la fiebre.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre. Si los síntomas continúan o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar al médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría "Ricardo Gutiérrez": (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650
Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900
www.lazar.com.ar
ANMAT Responde
0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON
SU MEDICO O FARMACEUTICO**

Conservación:

Conservar a una temperatura entre 15 y 30°C, al abrigo de la luz,
en su envase original.

Presentaciones:

Envases conteniendo 10 y 100 (dispenser) comprimidos.

**No utilizar este medicamento luego
de la fecha de vencimiento.**

Especialidad Medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud. Certificado N° 39.587



Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Última revisión del prospecto: 17/06/2021



36848/5
P178