

IBUMULTIN®
IBUPROFENO
Comprimidos de 600 mg
Venta bajo receta
Industria Argentina

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlos.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Qué contiene IBUMULTIN®?

Cada comprimido de 600 mg contiene:

Ibuprofeno: 600,000 mg. Excipientes: Almidón pregelatinizado; Celulosa microcristalina; Laurilsulfato de sodio; Almidón de maíz; Dióxido de silicio coloidal; Povidona (K-90); Ácido esteárico; Croscarmelosa sódica; Talco.

Acción Terapéutica:

Analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Calma el dolor, alivia la inflamación, baja la fiebre.

¿Para qué se usa IBUMULTIN®?

IBUMULTIN® se usa para el tratamiento de la fiebre, el tratamiento del dolor de intensidad moderada incluida la migraña, el tratamiento de la artritis (inflamación de las articulaciones, incluyendo habitualmente las de manos y pies, dando lugar a hinchazón y dolor), la artritis reumatoide juvenil, artrosis (trastorno de carácter crónico que ocasiona el daño del cartilago), inflamación no reumática y la dismenorrea primaria (menstruación dolorosa).

¿Qué personas no pueden recibir IBUMULTIN®?

No use este medicamento:

Si es alérgico al ibuprofeno, o a alguno de los demás componentes de este medicamento. Las reacciones que indican la alergia podrían ser: erupción cutánea con picor, hinchazón de la cara, labios o lengua, secreción nasal, dificultad respiratoria, broncoespasmo o asma.

Si padece una enfermedad grave del hígado o los riñones.

Si ha tenido una úlcera o hemorragia de estómago o de duodeno, o ha sufrido una perforación del aparato digestivo.

Si vomita sangre.

Si presenta heces negras o una diarrea con sangre.

Si tiene una hemorragia cerebrovascular activa u otra hemorragia activa.

Si padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea, o está tomando anticoagulantes medicamentos utilizados para

“fluidificar” la sangre). Si es necesario utilizar a la vez medicamentos anticoagulantes, el médico realizará unas pruebas para la coagulación sanguínea.

Si padece una insuficiencia cardíaca grave.

Si padece deshidratación grave causada por vómitos, diarrea o ingesta insuficiente de líquidos.

Si se encuentra en el tercer trimestre del embarazo.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Advertencias y precauciones

Hable con su médico o farmacéutico si:

Usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo “Infecciones”).

Infecciones:

IBUMULTIN® puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que IBUMULTIN® pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

Si usted padece alguna enfermedad del corazón o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol o triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, si usted es mayor de 65 años, si padece asma, alergias, problemas de estómago (ardor de estómago): Consulte a su médico.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Al igual que todos los medicamentos este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos de los medicamentos como ibuprofeno son más comunes en personas mayores de 65 años.

La incidencia de efectos adversos es menor en tratamientos cortos y si la dosis diaria está por debajo de la dosis máxima recomendada.

Este medicamento puede producir con mayor frecuencia, náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas en la sangre), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

¿Cómo se usa IBUMULTIN®?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene una infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

La dosis habitual para las enfermedades reumáticas es de 1.200 a 3.200 mg/ día, en tres o cuatro tomas. Luego de obtenerse una respuesta satisfactoria debe reducirse la dosis con fines de mantenimiento.

Generalmente se requieren mayores dosis para la artritis reumatoidea que para la osteoartritis. La dosis máxima es de 3.600 mg / día y sólo debe utilizarse si los beneficios clínicos de su administración compensan claramente los efectos adversos. No obstante, se recomienda no sobrepasar la dosis máxima diaria de 2.400 mg de ibuprofeno.

Para el dolor leve a moderado, fiebre y dismenorrea, la dosis habitual es de 200 a 400 mg cada 4 a 6 horas, según sea necesario. La dosis total diaria no debe exceder los 1.200 mg / día.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650

Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar

011-5550-2900

www.lazar.com.ar

ANMAT Responde

0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE
CON SU MEDICO O FARMACEUTICO**

Conservación:

Conservar a una temperatura entre 15 y 30°C, al abrigo de la luz, en su envase original.

Presentación:

IBUMULTIN® comprimidos de 600 mg: Envases conteniendo: 10 y 100 comprimidos.

**No utilizar este medicamento luego
de la fecha de vencimiento.**

Especialidad Medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud. Certificado N° 39.587



LAZAR

Dr. LAZAR y Cia. S.A.Q. e I.

Av. Vélez Sarsfield 5853/5855

B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires

Directora Técnica: Daniela A. Casas,

Farmacéutica y Bioquímica.

Última revisión del prospecto: 17/06/2021

36851/4
P175