

NEXPECIL®

LIMECICLINA

Cápsulas
Venta bajo receta archivada
Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO

Este medicamento puede obtenerse bajo prescripción médica.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Este medicamento ha sido prescripto solo para su problema actual. No lo recomiende a otras personas.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran, o si presenta algún efecto adverso descrito o efecto adverso no reportado CONSULTAR A UN MÉDICO.

En este prospecto:

1. Qué contiene **NEXPECIL®** y qué es la limeciclina
2. Para qué se utiliza
3. Quiénes no pueden utilizar este medicamento
4. Antes de tomar **NEXPECIL®**
5. Posibles efectos adversos
6. Cómo se usa **NEXPECIL®**
7. Información adicional para el paciente

1 ¿Qué contiene NEXPECIL®?

NEXPECIL® 150 mg cápsulas contiene limeciclina (equivalente a 150 mg de tetraciclina base). Excipientes c.s.
NEXPECIL® 300 mg cápsulas contiene limeciclina (equivalente a 300 mg de tetraciclina base). Excipientes c.s.

Acción Terapéutica:

Este producto pertenece a una familia de antibióticos conocida como tetraciclinas. El fármaco elimina diversos tipos de bacterias.

2 ¿Para qué se usa NEXPECIL®?

Está indicada en el tratamiento del acné por su alta actividad frente a *Propionibacterium* acnes. Su amplio espectro de actividad le confiere eficacia en

las infecciones por *Treponema pallidum* en los casos de alergia a betalactámicos e infecciones por Spiroquetas, como en la enfermedad de Lyme, así como gonococo, *Haemophilus influenzae*, *Pasteurella*, *Rickettsia*, *Leptospira*, *Mycoplasma pneumoniae*, *U. urealyticum* y *Chlamydia*.

3 ¿Qué personas no pueden utilizar NEXPECIL®?

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico a algunos de los ingredientes del medicamento o de la familia de las tetraciclinas. No se debe administrar este producto a niños menores de 12 años de edad, debido al riesgo de manchado dental permanente y escaso desarrollo del esmalte dental. No debe ser administrado durante el embarazo ni en el período de lactancia.

4 ¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?

- Indique a su médico si sufre o alguna vez sufrió alguna afección médica como problemas hepáticos y/o renales serios.
- Informe a su médico si está tomando otros medicamentos como retinoides orales (sustancias derivadas de la vitamina A), preparaciones con hierro y antiácidos tales como el hidróxido de aluminio y/o magnesio, sales de calcio (pueden disminuir la absorción de las tetraciclinas), anticoagulantes, diuréticos, etc.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene planeado embarazarse o está amamantando.

5 ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

La limeciclina puede causar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es intenso o no desaparece:

- Molestias gastrointestinales: náuseas, ardor y malestar estomacal, diarrea, glositis (inflamación, hinchazón o llagas en la lengua) y enterocolitis (inflamación intestinal).
- Reacciones de alergia (urticaria, erupción, picazón).
- Reacciones de fotosensibilidad (lesiones en la piel producto de la exposición solar).
- Anemia hemolítica, trombocitopenia (reducción de las plaquetas, una célula de la sangre), reducción de los glóbulos blancos, y otros trastornos de la sangre.

Ante cualquier duda o aparición de algún otro síntoma durante el tratamiento, consulte con su médico.

6 ¿Cómo se usa NEXPECIL®?

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Para el acné severo 600 mg al día (divididos en dos tomas) durante 15 días y continuar con 300 mg diariamente como dosis de mantenimiento al menos 8 semanas.

Para el acné moderado a leve 300 mg al día durante 15 días y continuar con 150 mg diariamente como dosis de mantenimiento al menos 8 semanas.

En cualquier otra indicación diferente al tratamiento del acné, la dosis en adultos es de 600 mg al día divididos en dos tomas.

Debe tomarse con una adecuada cantidad de líquido. La ingesta concurrente de alimentos, en particular leche, no modifica en forma significativa la absorción de limeciclina.

No se automedique con **NEXPECIL®**. Es importante que usted no tome mayor cantidad de que lo indicado por su médico.

7 ¿Qué debo hacer ante una sobredosis?

Es rara una sobredosis aguda con antibióticos y no existe tratamiento específico. No obstante, si llegase a ocurrir se deberá mantener una ingesta de líquidos elevada. En caso de ingestión accidental llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650
Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900

www.lazar.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la
Página Web de la ANMAT:
<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>
o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

"Este medicamento debe ser usado bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica"

Presentaciones:

NEXPECIL® 150 mg cápsulas: Envases conteniendo 30 cápsulas.

NEXPECIL® 300 mg cápsulas: Envases conteniendo 15 y 30 cápsulas.

Conservación:

Conservar en temperatura entre 15 y 30 °C en su envase original.

No utilizar luego de la fecha de vencimiento.

Especialidad medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud. Certificado N° 58.007



Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sársfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. De Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de última revisión de prospecto: 31/07/2017

36875/3
P332