

PARACETAMOL LAZAR®

PARACETAMOL

Comprimidos 500 mg
Industria Argentina
Venta Libre

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Contenido del prospecto

1. Qué es **Paracetamol Lazar®** y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar **Paracetamol Lazar®**
4. Posibles efectos adversos
5. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es **Paracetamol Lazar®** y para qué se utiliza

Paracetamol pertenece al grupo de medicamentos analgésicos y antipiréticos.

Paracetamol está indicado para el tratamiento sintomático del dolor leve a moderado y la fiebre.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar **Paracetamol Lazar®**

No tome **Paracetamol Lazar®**

- Si es alérgico al paracetamol, o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 5).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar **Paracetamol Lazar®**.

No tomar más dosis de la recomendada en el apartado 3.

En pacientes asmáticos sensibles a la aspirina se deberá consultar con el médico antes de tomar este medicamento.

Si padece enfermedad de riñón, corazón o del pulmón, o tiene anemia, deberá consultar con su médico antes de tomar este medicamento.

En alcohólicos crónicos se deberá tener la precaución de no tomar más de 2 g/día de paracetamol.

Si el dolor se mantiene durante más de 5 días, la fiebre más de 3 días o bien el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas, se debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Toma de **Paracetamol Lazar®** con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

El paracetamol puede tener interacciones con los siguientes medicamentos:

- Medicamento para evitar coágulos en la sangre: Anticoagulantes

orales (acenocumarol, warfarina)

- Medicamentos para tratar la epilepsia: Antiepilépticos (lamotrigina, fenitoína u otras hidantoínas, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona, carbamacepina)

- Medicamentos para tratar la tuberculosis (isoniazida, rifampicina)

- Medicamentos para disminuir los niveles de colesterol en sangre (colestiramina)

- Medicamentos utilizados para aumentar la eliminación de orina (diuréticos del asa como los del grupo furosemida)

- Medicamentos utilizados para el tratamiento de la gota (probenecid y sulfinpirazona)

- Medicamentos utilizados para evitar náuseas y vómitos: Metoclopramida y domperidona

- Medicamentos utilizados en el tratamiento de las alteraciones del ritmo del corazón (arritmias cardíacas): Propranolol.

No utilizar junto con otros analgésicos sin consultar al médico.

Como norma general para cualquier medicamento es recomendable informar sistemáticamente al médico o farmacéutico si está recibiendo otro medicamento. En caso de tratamiento con anticoagulantes orales se puede administrar ocasionalmente como analgésico de elección.

Interferencias con pruebas analíticas:

Si le van a realizar alguna prueba analítica (incluidos análisis de sangre, orina, pruebas cutáneas que utilizan alérgenos, etc) comunique al médico que está tomando este medicamento, ya que puede alterar los resultados de dichas pruebas.

Toma de **Paracetamol Lazar®** con alimentos y bebidas

La utilización de paracetamol en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas al día -cerveza, vino, licor-) puede provocar daño en el hígado.

La toma de este medicamento con alimentos no afecta a la eficacia del mismo.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

En caso necesario, se puede utilizar **Paracetamol Lazar®** durante el embarazo. Debe utilizar la dosis más baja posible que reduzca el dolor o la fiebre y utilizarla durante el menor tiempo posible. Contacte con su médico si el dolor o la fiebre no disminuyen o si necesita tomar el medicamento con más frecuencia.

Conducción y uso de máquinas

No se ha descrito ningún efecto que modifique la capacidad de conducción y de manejo de maquinaria.

3. Cómo tomar **Paracetamol Lazar®**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Este medicamento debe tomarse por vía oral. Según sus preferencias, los comprimidos se pueden ingerir directamente o partidos por la mitad con agua, leche o jugo de frutas. La dosis usual es:

Adultos y niños mayores de 15 años: la dosis habitual es de 1 ó 2 comprimidos 3-4 veces al día. Las tomas deben espaciarse al menos 4 horas. No se tomarán más de 8 comprimidos (4 g) en 24 horas.

Adolescentes de 12 a 15 años: 1 o 1½ comprimido de 500 mg cada 4 horas, hasta un máximo de 2 g (aproximadamente 4 comprimidos de 500 mg) en 24 horas.

Uso en niños y adolescentes: Los niños y adolescentes menores de 12 años no pueden tomar **Paracetamol Lazar®** 500 mg.

Pacientes con enfermedades del hígado: antes de tomar este medicamento tienen que consultar a su médico. Deben tomar la cantidad de medicamento prescrita por su médico con un intervalo mínimo de 8 horas entre cada toma. No deben tomar más de 2 gramos o 4 comprimidos de 500 mg de paracetamol en 24 horas.

Pacientes con enfermedades del riñón: antes de tomar este medicamento tienen que consultar a su médico. Tomar como máximo 500 miligramos por toma.

Pacientes de edad avanzada: deben consultar a su médico.

Si se estima que la acción de **Paracetamol Lazar®** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

NO UTILIZAR POR MÁS DE 5 DÍAS PARA EL DOLOR Y 3 DÍAS PARA LA FIEBRE O BIEN SI EL DOLOR O LA FIEBRE EMPEORAN O APARECEN OTROS SÍNTOMAS, SUSPENDA LA MEDICACIÓN Y CONSULTE A SU MÉDICO.

Si olvidó tomar Paracetamol Lazar®

No tome una dosis doble para reemplazar las dosis olvidadas, simplemente tome la dosis olvidada cuando se acuerde, tomando las siguientes dosis con la separación entre tomas indicada en cada caso (al menos 4 horas).

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **Paracetamol Lazar®** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Este medicamento puede producir los siguientes efectos adversos:

- Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes): malestar, bajada de presión (hipotensión) y aumento de los niveles de transaminasas en sangre.

- Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 pacientes): Enfermedades del riñón, orina turbia, dermatitis alérgica (erupción cutánea), ictericia (coloración amarillenta de la piel), alteraciones sanguíneas (disminución de glóbulos blancos y anemia)- e hipoglucemia (descenso de azúcar en sangre). El paracetamol puede dañar el hígado cuando se toma en dosis altas o en tratamientos prolongados. Se han notificado muy raramente casos de reacciones graves en la piel.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Si se ha tomado una sobredosis, debe acudir inmediatamente a un centro médico aunque no haya síntomas ya que a menudo no se manifiestan hasta pasados tres días de la toma de la sobredosis, aún en casos de intoxicación grave. Los síntomas por sobredosis

pueden ser: mareos, vómitos, pérdida de apetito, coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia) y dolor abdominal.

El tratamiento de la sobredosis es más eficaz si se inicia dentro de las 4 horas siguientes a la toma del medicamento.

Los pacientes en tratamiento con barbitúricos o que padezcan alcoholismo crónico pueden ser más susceptibles a una sobredosis de paracetamol.

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650

Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001

5. Contenido del envase e información adicional

Cada comprimido de 500 mg contiene: Paracetamol: 500,00 mg; Almidón de maíz: 38,89 mg; Povidona: 8,33 mg; Almidón glicolato sódico: 5,56 mg; Ácido esteárico: 2,78 mg.

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar

011-5550-2900

www.lazar.com.ar

ANMAT Responde

0800-333-1234

Presentaciones:

Envases conteniendo 20 y 100 comprimidos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON
SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**

Conservación:

Conservar a una temperatura entre 15 y 30°C, al abrigo de la luz, en su envase original.

**No utilizar este medicamento luego
de la fecha de vencimiento.**

Especialidad Medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud. Certificado N° 39.626



Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Última revisión del prospecto: 12/07/2021

36889/1
P357