



PARATROPINA® METILBROMURO DE HOMATROPINA

Gotas
Comprimidos
Industria Argentina
Venta Libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene PARATROPINA®?

Cada 100 ml contiene:
Homatropina Metilbromuro:
200,00 miligramos; Metilparabeno; Agua purificada c.s.p.
Cada comprimido contiene:
Homatropina Metilbromuro:
4,0 miligramos; Almidón; Lactosa; Aerosil; Celulosa
Microcristalina; Talco; Estearato de Magnesio y Azul patente.

Acción terapéutica:

PARATROPINA® calma los dolores (antiespasmódico) y el dolor de tipo cólico.

¿Para qué se usa PARATROPINA®?

Paratropina® brinda alivio temporal de los espasmos dolorosos -cólicos o retortijones- del aparato digestivo, vías biliares y el aparato genitourinario.

¿Qué personas no deben recibir PARATROPINA®?

No use este medicamento si usted:
• sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes del medicamento o a otros antiespasmódicos, sufre glaucoma de ángulo estrecho (aumento de la presión ocular),
• padece agrandamiento de próstata, tendencia a la retención urinaria o dificultades para orinar.
• tiene náuseas o vómitos
• padece colitis ulcerosa (enfermedad inflamatoria crónica intestinal) o miastenia gravis (enfermedad caracterizada por debilidad muscular).

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Si usted está tomando antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos o medicamentos para la enfermedad de Parkinson, debe consultar a su médico antes de tomar **PARATROPINA®**.
También debe consultar al médico si sufre de hipertiroidismo (aumento de hormonas tiroideas), insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad isquémica del corazón (infarto o

angina de pecho), estrechamiento de la válvula mitral, reflujo gastroesofágico o hernia hiatal.

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar **PARATROPINA®**.

Tenga presente que los ancianos pueden presentar mayor susceptibilidad a los efectos de la **PARATROPINA®**.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como sensación de boca seca, erupciones en la piel, entorpecimiento del tránsito gastrointestinal, dificultad para orinar, enrojecimiento del rostro, dilatación de pupilas, fotofobia (molestia visual ante la luz brillante), palpitaciones, taquicardia (aumento de la frecuencia de los latidos) y arritmias (alteración en el ritmo de los latidos). Puede producir problemas para enfocar la vista y visión borrosa, por lo que se recomienda precaución y evitar conducir vehículos u operar maquinarias peligrosas hasta que se normalice la visión.

No tome **PARATROPINA®** por más de 24 horas sin consultar al médico. Si el dolor abdominal o los cólicos persisten más de 24 horas, o empeoran los síntomas, consulte de inmediato.

¿Cómo se usa PARATROPINA®?

Gotas:

Adultos: Se recomienda tomar 40 gotas de **PARATROPINA®** diluidas en medio vaso de agua. Esta dosis puede repetirse hasta cuatro veces por día con un intervalo de 6 horas entre cada una de ellas.

Niños de 6 a 12 años: consulte al médico pediatra.

Comprimidos:

Adultos: se sugiere tomar un comprimido por vía oral, cada 6 hs.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-8648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650
Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-8001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar: 011-5550-2900
<http://www.paratropina.com.ar>

ANMAT Responde: 0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO O FARMACEUTICO

Conservación:

Conservar a una temperatura entre 15 y 30°C, al abrigo de la luz, en su envase original.

Presentaciones:

PARATROPINA® Gotas (2 mg/ml):
Envases conteniendo 22 ml,
PARATROPINA® Comprimidos (4 mg):
Envases conteniendo 24 comprimidos.

No utilizar este medicamento luego de la fecha de vencimiento

Especialidad Medicinal Autorizada por el
Ministerio de Salud. Certificado Nº 4.826



Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EP1 Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

36918/5
P160

