

PYRALVEX®
EXTRACTO DE GLUCÓSIDOS ANTRAQUINÓNICOS
DE RHEUM OFFICINALE (RUIBARBO)
ÁCIDO SALICÍLICO

Solución Tópica
Industria Argentina
Venta bajo receta

Fórmula cuali-cuantitativa:

Cada 100 ml de solución contiene:
Extracto de glucósidos antraquinónicos de Rheum officinale
(ruibarbo) (equivalente a 0,5 g de glucósidos antraquinónicos) 5 g
Ácido salicílico 1 g
Alcohol 70 ml
Agua destilada c.s.p. 100 ml

Acción Terapéutica:

Antiflogístico y antibacteriano para la mucosa bucal.
Grupo farmacoterapéutico: A 01 AD (Agente para tratamiento oral local).

Características farmacológicas / propiedades:

- **Acción farmacológica:** Aplicado localmente, este producto ejerce una acción antiflogística y antibacteriana. Además, atenúa el dolor provocado por las lesiones inflamatorias.
- **Farmacocinética:** No se conocen datos farmacocinéticos de este producto.

Indicaciones:

Tratamiento local de las lesiones inflamatorias de la mucosa bucal.
Afecciones bucodentales.
Aftas orales.

Posología y administración:

Aplicar de dos a cuatro veces por día, sobre la zona lesionada, usando el pincel que se proporciona. No enjuague la boca inmediatamente después de la aplicación.

Advertencias:

No se conocen.

Precauciones

Generales: No se conocen.

Interacciones: No se conocen.

• **Uso durante el embarazo:** Debido a que no se conocen estudios adecuados realizados con este producto, se recomienda usarlo durante el embarazo solo cuando los beneficios superan los riesgos potenciales.

• **Uso durante la lactancia:** Debido a que no se conocen estudios adecuados realizados con este producto, se recomienda usarlo durante la lactancia solo cuando los beneficios superan los riesgos potenciales.

Efectos Colaterales:

Puede producir transitoriamente un tinte amarillento en los dientes, el cual desaparece totalmente en 24 o 48 hs.
Por su contenido de alcohol puede producir ardor local durante su aplicación.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Niños menores de años.

Contiene 56,7% P/V de alcohol etílico.

Sobredosificación:

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

"Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología".

Hospital de Pediatría "R. Gutiérrez": (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

CONSULTE A SU MÉDICO

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas."

Presentación: Envases conteniendo 10 ml.

Conservación: Conservar a una temperatura entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz, en su envase original.

No utilizar este medicamento luego de la fecha de vencimiento.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud. Certificado n° 19.217

MEDA

Con licencia de:
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Bad Homburg, Germany

L
LAZAR

Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. De Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

36935/3
P168