

RESAQUIT®
ACIDO ACETILSALICILICO - CAFEINA -
HIDROXIDO DE ALUMINIO - HIDROXIDO
DE MAGNESIO - PARACETAMOL

Comprimidos
Venta libre
Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES
DE TOMAR EL MEDICAMENTO**

¿Qué contiene RESAQUIT®?

Cada comprimido bicapa contiene:

Ácido acetilsalicílico	227,00 mg
Paracetamol.....	194,00 mg
Cafeína.....	33,00 mg
Hidróxido de aluminio.....	25,00 mg
Hidróxido de magnesio.....	50,00 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina PH 200; Colorante tartrazina; Croscarmelosa sódica; Almidón pregelatinizado; Estearato de magnesio; Povidona; Óxido de hierro negro; Almidón de maíz; Almidón de glicolato de sodio; Ácido esteárico.

Acción Terapéutica:

Analgésico. Antiácido.

¿Para qué se usa RESAQUIT®?

Para el alivio de los trastornos digestivos que se acompañan de acidez estomacal y dolor de cabeza, por ejemplo aquellos asociados a desarreglos en la ingesta.



¿Qué personas no pueden recibir RESAQUIT®?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al paracetamol, al ácido acetilsalicílico u otros compuestos del medicamento; en presencia de trastornos hemorrágicos (sangrado); en presencia de úlceras gástricas o duodenales, problemas de hígado, corazón o riñones.

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones en la piel, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico.

Si padece asma, diabetes, hipertensión arterial no

controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea, consulte a su médico.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 15 años sin consultar al médico. No administrar en menores de 15 años en caso de SÍNTOMAS DE GRIPE o VARICELA ya que puede incrementar el riesgo de desarrollar complicaciones severas.

Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted toma otros medicamentos como anticoagulantes, medicación para la diabetes, para el corazón, antiepilépticos o antiinflamatorios, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Las personas de mayores de 65 años no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos.

Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal.

El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis. La ingesta del paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente. No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto.

Si Ud. está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Este medicamento puede producir taquicardia (aumento del número de latidos del corazón), nerviosismo, insomnio, estimulación del sistema nervioso central, temblor. Hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas (disminución de plaquetas).

¿Cómo se usa RESAQUIT®?

En adultos y mayores de 15 años: un comprimido cada 6 horas, por vía oral, con un vaso de agua o jugo de frutas. Dosis máxima: 4 comprimidos por día. No tomar por más de 2 (dos) días.

Si los síntomas de malestar y cefalea persisten por más de 2 días de tratamiento con RESAQUIT®, consultar al médico.

¿Qué debo hacer si tomé más cantidad de la necesaria?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650
Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-8001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900
www.lazar.com.ar

ANMAT Responde
0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON
SU MEDICO O FARMACEUTICO**

Conservación:

Conservar a una temperatura entre 15 y 30°C, al abrigo de la luz, en su envase original.

Presentaciones:

RESAQUIT® se presenta en envases con 4 y 12 comprimidos bicapa.

**ESTE MEDICAMENTO CONTIENE
TARTRAZINA COMO COLORANTE**

No utilizar este medicamento luego de la
fecha de vencimiento.

Especialidad medicinal autorizada por
el Ministerio de Salud. Certificado N° 55.018



Dr. LAZAR y Cia. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

En Ecuador: R.S. N° 423-MEE-0814
En Honduras: R.S. N° HN-M-1121-0150.

Última revisión del prospecto: 29/04/2013

36945/11
P177