

SIMEFLAT®

SIMETICONA

Comprimidos
Gotas
Venta Bajo Receta
Industria Argentina

Fórmula:

Cada comprimido contiene: Simeticona: 200,00 mg; Povidona K30: 92,20 mg; Almidón pregelatinizado: 12,00 mg; Carbonato de magnesio extra liviano: 395,00 mg; Celulosa microcristalina: 69,20 mg; Sacarina sódica: 1,80 mg; Esencia de menta: 1,80 mg; Croscarmelosa sódica: 24,00 mg; Estearato de magnesio: 4,00 mg.

Cada 100 ml de gotas contiene: Simeticona: 4,000 g; Sucralosa: 0,020 g; Hidroxipropilmetilcelulosa K100LV: 1,250 g; Hidroxietilcelulosa: 0,500 g; Clorhexidina digluconato al 20 %: 0,015 g; Glicerina: 6,500 g; Acido cítrico anhidro: 0,010 g; Esencia de dulce de leche: 0,010 g; Alcohol etílico: 1,20 ml; Metilparabeno: 0,120 g; Propilparabeno: 0,030 g; Sorbitol 70%: 18,000 g; Agua purificada c.s.p.: 100,0 ml.

Acción Terapéutica:

Antiflatulento.

Indicaciones:

Alivio sintomático de los gases en adultos, niños y lactantes.

Acción Farmacológica:

La simeticona reduce la tensión superficial de las burbujas aéreas en el tubo digestivo facilitando su dispersión y por lo tanto su eliminación aliviando los síntomas secundarios al exceso de gas en el tracto gastrointestinal.

Farmacocinética:

La simeticona actúa a nivel de la luz intestinal sin modificarse ni absorberse.

Posología - Modo de Administración:

Comprimidos:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 2 veces por día. No administrar más de 480 mg al día (3 comprimidos/d).

Niños entre 6 y 12 años: 1 comprimido por día, aunque se recomienda utilizar la forma farmacéutica gotas.

Gotas:

Niños mayores de 6 años: 15 a 20 gotas, después de las comidas y antes de dormir, eventualmente con un poco de líquido. No administrar más de 225 mg de simeticona. (más de 100 gotas/d).

Niños menores de 6 años y lactantes: 10 a 15 gotas, dos a tres veces por día en la mamadera, o después de las comidas respectivamente. No administrar más de 225 mg de simeticona (más de 100 gotas/d).

Si los síntomas empeoran o persisten después de 10 días de tratamiento, se deberá evaluar la situación clínica.

AGITASE BIEN ANTES DE USAR

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a la simeticona o a alguno de los excipientes. Perforación y obstrucción intestinal conocida o sospechada.

Precauciones:

Contenido de alcohol etílico en la suspensión oral: 0,9 g%

Reacciones Adversas:

No presenta.

Sobredosificación:

Aún no se han informado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:

(011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas:

(011) 4654-6648/4658-7777.

Conservación:

Comprimidos Almacenar en lugar seco, entre 15 °C y 30 °C.

Gotas: Almacenar entre 15 °C y 30 °C.

Presentaciones:

Gotas: Envases conteniendo 20 ml.

Comprimidos: Envases conteniendo 10 y 30 comprimidos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal

Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 52.037

Dr. LAZAR® y Cía. S.A.Q. e I.

Av. Vélez Sarsfield 5855

B1605 EPI Munro

Directora Técnica:

Daniela A. Casas,

Farm. y Bioq.



Fecha revisión del prospecto: 02/04/2025

37006/2
P691