

TERVALON® 5 mg y 10 mg

AMLODIPINA 5 mg y 10 mg

Comprimidos
Venta bajo receta
Industria Argentina

Fórmula:

Cada comprimido de 5 mg contiene:	
Amlodipina (como Besilato)	5,00 mg
Polietilenglicol 3350	2,25 mg
Fosfato bicalcico anhidro	27,30 mg
Celulosa microcristalina	103,70 mg
Almidón glicolato de sodio	7,39 mg
Estearato de magnesio	2,36 mg

Cada comprimido de 10 mg contiene:	
Amlodipina (como Besilato)	10,00 mg
Celulosa microcristalina ph102	175,50 mg
Fosfato bicalcico anhidro	46,16 mg
Almidón glicolato de sodio	12,50 mg
Estearato de magnesio	4,00 mg
Polietilenglicol 3350	3,84 mg

Acción Terapéutica: Antagonista del calcio.

Indicaciones:

Hipertensión arterial leve, moderada y severa.
Angina de pecho estable crónica.
Angina de Prinzmetal o angina variante.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a las dihidropiridinas. Lactancia. Niños.

Precauciones y advertencias:

La amlodipina puede usarse en dosis normales en pacientes geriátricos y en insuficiencia renal. En casos de insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca o estenosis aórtica debe administrarse con precaución. Aun no se ha determinado la inocuidad de la amlodipina durante el embarazo. Por lo tanto el médico evaluará los beneficios para la madre versus los posibles riesgos del feto.

TERVALON® puede administrarse sin inconvenientes conjuntamente con diuréticos tiazídicos, bloqueantes beta, inhibidores de la ECA, trinitrina, ni-

tratos, antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos: al igual que con cimetidina, digoxina, fenitoina, warfarina, hipoglucemiantes orales.

Efectos secundarios: En general **TERVALON®** es bien tolerado en dosis hasta 10 mg por día. Los posibles efectos secundarios, generalmente leves o moderados, consisten principalmente en dolores de cabeza y edema.

Raras veces se han observado náuseas, vértigo, rubor, palpitaciones, somnolencia.

Posología: La posología debe ser ajustada de acuerdo a las necesidades.

Hipertensión: Iniciar el tratamiento con 1 comprimido de **TERVALON®** 5 mg por día y llevar a un máximo de 1 comprimido **TERVALON®** 10 mg por día.

En pacientes de bajo peso, frágiles o ancianos o en aquellos que sufren de insuficiencia hepática debe iniciarse el tratamiento con ½ comprimido de **TERVALON®** 5 mg una vez al día.

Angina de pecho: 1 comprimido de **TERVALON®** 5 mg o 10 mg una vez por día; recomendándose 5 mg en pacientes geriátricos y en insuficiencia hepática. La mayoría de los pacientes necesitan 10 mg para obtener una acción adecuada.

Presentación: Envases conteniendo 30 y 100 comprimidos de 5 mg y 10 mg

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal Autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 43.671



Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro,
Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica:

Daniela A. Casas, farm. y bioq.

37095/5
P198

