

PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

XICLOVIR H
ACICLOVIR 5%
HIDROCORTISONA 1%
Crema
Venta bajo receta
Industria Argentina

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR A USAR EL MEDICAMENTO.

- **Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.**
- **Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.**
- **Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.**
- **Si considera que alguno de los eventos adversos que sufre es grave o si observa cualquier evento adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.**

¿Qué contiene este prospecto?

- 1. Qué es XICLOVIR® H y para que se utiliza**
- 2. Qué necesita saber antes de usar XICLOVIR® H**
- 3. Cómo utilizar XICLOVIR® H**
- 4. Cuáles son los posibles efectos adversos de XICLOVIR® H**
- 5. Información adicional**
- 6. Presentación**

1. Qué es XICLOVIR® H y para qué se utiliza.

XICLOVIR H es la combinación de dos ingredientes farmacéuticos activos: Aciclovir, un antiviral e Hidrocortisona, un antiinflamatorio.

Este medicamento se utiliza en personas mayores de 12 años para acortar el tiempo de cicatrización del herpes labial y disminuir la probabilidad de desarrollar úlceras en el labio o en la piel cercana.

No constituye una cura definitiva para el herpes labial.

2. Qué necesita saber antes de usar XICLOVIR® H.

No debe utilizar XICLOVIR® H:

Si Ud. es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los componentes del medicamento.

Si Ud. está embarazada o en período de lactancia.

Tenga especial cuidado con XICLOVIR® H e informe a su médico:

Si su sistema inmunitario está debilitado (bajas defensas) ya que en ese caso XICLOVIR® H podría ser perjudicial.

Si puede estar embarazada ya que se desconoce si este medicamento puede perjudicar al feto.

Uso de otros medicamentos

No se conocen interacciones farmacológicas con el uso de XICLOVIR® H.

Fertilidad, Embarazo y Lactancia

No se aplique XICLOVIR® H si está embarazada o amamantando.

3. Cómo utilizar XICLOVIR® H

Siga exactamente las indicaciones de administración que le ordenó su médico. En el caso de que tenga dudas consúltelo nuevamente.

A modo de sugerencia:

Utilice XICLOVIR® H en forma temprana, ante el primer signo de aparición de herpes labial.

Lávese las manos antes y después de utilizar XICLOVIR® H.

Limpie y seque la piel antes de aplicarse XICLOVIR® H.

Coloque una capa fina de XICLOVIR® H sobre las lesiones 5 veces por día durante 5 días seguidos.

No friccione las lesiones ya que ellas puedan esparcirse a otras zonas alrededor de la boca y empeorar el problema.

No cubra las zonas donde se aplicó esta crema con un apósito.

No utilice otros productos para la piel como maquillaje, protector solar, crema para labios, etc. sobre las lesiones o sus áreas circundantes.

No se bañe o se duche hasta luego de pasados 30 minutos de la aplicación de XICLOVIR® H.

Si se aplica más XICLOVIR® H del que debiera:

Es poco probable que ocurra una sobredosis de XICLOVIR® H con la aplicación tópica ya que la exposición sistémica es mínima.

No obstante puede contactar a su médico, ir a un centro de atención médica o consultar con un centro de atención toxicológica:

Hospital de Pediatría "Ricardo Gutiérrez" : (011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas : (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650

Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001

Si olvidó una aplicación de XICLOVIR® H

Si usted olvidó una aplicación, realícela en ese momento y luego continúe normalmente.

4. Cuáles son los posibles efectos adversos de XICLOVIR® H

Al igual que todos los medicamentos, XICLOVIR® H puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los van a presentar.

Los más frecuentes son: descamación de la piel, prurito o quemazón después de la aplicación, enrojecimiento de la piel, cambios en el color de la piel, inflamación en el lugar de la aplicación.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si presenta cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. Información adicional.

Composición de XICLOVIR® H

Los principios activos son aciclovir e hidrocortisona.

Cada 100 gramos de crema contiene 5 gramos de aciclovir y 1 gramo de hidrocortisona.

Los demás componentes son inactivos.

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. LAZAR®

011-5550-2900

www.lazar.com.ar

ANMAT Responde

0800-333-1234

6. Presentación

XICLOVIR® H se presenta en 1 pomo con 5 g de crema.

Conservar entre 15°C y 30°C en envase bien cerrado

MANTENGASE ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO

Especialidad Medicinal Autorizada por
el Ministerio de Salud. Certificado N°:

Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.

Av. Vélez Sarsfield 5855 B1605 EPI Munro

Directora Técnica: Daniela A. Casas, Farm. y Bioq.

Fecha de última revisión del prospecto:.....